


## Le Cerisier tardif (*Prunus serotina*)

*Appelé aussi merisier américain en raison de son aire naturelle couvrant l'Est des USA, le cerisier tardif est un petit arbre assez couramment employé dans les haies bocagères. S'il peut donner de jolis sujets et produire du bois de qualité en Amérique, on déplore chez nous sa forme buissonnante, probablement liée à des origines génétiques défectueuses. Espèce invasive dispersée par les oiseaux et multipliée par drageonnement, cet inconvénient constitue une raison supplémentaire pour limiter son introduction au profit de fruitiers autochtones comme le merisier.*

### CARACTERES BIOLOGIQUES :



fleurs


2 faces de la  
feuille

écorce

- Arbre de longévité réduite en moyenne à 150 ans dans son aire naturelle et une centaine d'années en cas d'introduction.
- Diamètre rarement supérieur à 50cm.
- Hauteur limitée à 15-20 mètres.
- Feuilles alternes caduques, lancéolées et denticulées, vert lustré sur le dessus, plus mates dessous avec des poils roux ou cendrés le long de la nervure principale.
- Longues grappes pendantes de fleurs blanches odorantes.
- Petites cerises un peu amères, luisantes et noires à maturité.
- Drageonne et rejette abondamment après coupe.



Essence réclamant rapidement la pleine lumière mais relativement tolérante à l'ombrage au stade juvénile. Peu sensible au froid, elle est cassante au vent en situation exposée.



Supporte une acidité marquée. Préfère les sols siliceux légers, profonds et frais mais non mouilleux et se comporte assez bien sur terrain à bilan hydrique réduit.

## PRINCIPAUX ENNEMIS ET DÉFAUTS



La mauvaise conformation de la plupart des sujets plantés est le principal handicap, loin devant les pathologies comme les pourritures de cœur occasionnées par les blessures au pied.

## QUALITÉS DU BOIS ET USAGES

Bois brun rosé assez dur à grain fin, aux mêmes usages que le merisier auquel il se substitue par importation massive de sciages destinés à la fabrication de meubles en série (photo ci-contre : une commode style Régence).



POUR EN SAVOIR PLUS : *Guide de dendrologie - ENGREF (1992) ; Flore forestière française - Tome 1 - IDF (1989)*

**CRPF BRETAGNE :**

Centre Régional de la Propriété Forestière de Bretagne - 8 place du colombier - 35000 RENNES

☎ : 02 99 30 00 30

Fax : 02 99 65 15 35

e-mail : [bretagne@crpf.fr](mailto:bretagne@crpf.fr)

[www.crpf.fr/bretagne](http://www.crpf.fr/bretagne)