


# Le Merisier (*Prunus avium*) Ar Wezenn-babu

*Le merisier ou "cerisier sauvage" est une essence spontanée en Bretagne, présente principalement dans l'Est de la région. On la rencontre essentiellement dans les haies et les boqueteaux, mais aussi dans les massifs forestiers où elle est pousse à l'état disséminé.*

*La place importante qu'occupe le merisier dans le mobilier traditionnel breton témoigne de la forte présence de cette essence aujourd'hui en recul dans le bocage.*

## CARACTERES BIOLOGIQUES :

- Arbre pouvant vivre 120 ans voire plus.
- Hauteur maximale 20 à 25 mètres.
- Feuillage moyennement dense, caduc, prenant une teinte rouge vif à l'automne.
- Essence de pleine lumière, à croissance rapide.
- Fleurs à la fois mâles et femelles. Pollinisation par les insectes, dispersion par les animaux et notamment les oiseaux.
- Souche et racines aptes à produire des rejets vigoureux.



Floraison blanche apparaissant en avril-mai.




Feuilles simples alternes, légèrement dentées, avec deux petites glandes à leur base.

Petites cerises (merises) avec une longue tige, vertes puis devenant noires à maturité.

Tronc droit, souvent cannelé ou méplat, écorce brun-rouge restant lisse et s'exfoliant en lanières horizontales.



Le merisier n'est pas très exigeant en pluviométrie ; il réclame par contre un espace vital important et n'apprécie pas les zones ventées. Les gelées printanières peuvent détruire sa fructification.



Le merisier aime les sols frais, profonds et meubles, mais il fuit les milieux engorgés. Exigeant en éléments nutritifs, il recherche les terrains forestiers les plus riches de la région.

## PRINCIPAUX ENNEMIS ET DEFAUTS :

- Le merisier est sensible à un certain nombre d'ennemis parmi lesquels un champignon microscopique, la cylindrosporiose, qui occasionne la chute prématurée des feuilles dès le début de l'été consécutivement à un printemps frais et pluvieux.
- le "puçeron noir" dessèche les pousses et racornit les feuilles,
- le chevreuil qui est friand de ses pousses, le mutile également par ses frottis répétés.
- la "veine verte", anomalie liée à des tensions internes du bois, se caractérise par une coloration particulière qui donne son nom à ce défaut.

## QUALITÉS DU BOIS ET USAGES :

C'est un bois à grain fin de dureté moyenne dont la couleur varie naturellement du miel clair au brun-rougeâtre. Il se travaille très bien à tous les niveaux de transformation : sciage, tranchage, rabotage...

Néanmoins son bois peu durable, sensible aux insectes et aux champignons, le confine à des usages intérieurs.

Il est très recherché principalement en mobilier (placage industriel ou meuble massif). Au demeurant, c'est un bon bois de feu !



Beau meuble en merisier.

POUR EN SAVOIR PLUS : - A la découverte des fruitiers forestiers CRPF Bretagne 2000

- Fiche technique merisier CRPF Bretagne 1999



MINISTÈRE  
DE L'AGRICULTURE  
ET DE LA PÊCHE

### CRPF BRETAGNE :

Centre Régional de la Propriété Forestière de Bretagne - 8 place du colombier - 35000 RENNES

☎ : 02 99 30 00 30

Fax : 02 99 65 15 35

e-mail : [bretagne@crpf.fr](mailto:bretagne@crpf.fr)

