

Chênaies-ormaises à frêne oxyphylle



O. Carbot - PNR Marais Poitevin

Cet habitat d'un grand intérêt patrimonial est typique des forêts inondables riveraines des grands fleuves comme la Loire.

Il est peu représenté et sur de petites surfaces, et peut être associé aux prairies humides, aux milieux marécageux ou encore aux roselières.

Les sols fertiles permettent le développement d'une végétation diversifiée à tous les étages.

Reconnaître l'habitat

■ Les arbres

Les Frênes commun et oxyphylle, l'Orme et le Chêne pédonculé sont les principaux arbres représentatifs de l'habitat.



M. Bartoli - IDF

Orme champêtre.



P. Blanchard - CRPF PDL

Frêne commun.



J. Lemaire - IDF

Chêne pédonculé.



B. Longa - CRPF PDL

Cornouiller sanguin.



B. Longa - CRPF PDL

Aubépine épineuse.

■ La végétation herbacée

Elle est souvent dominée par les laïches :
Ronce bleue,
Cardamine des prés,
Primevère élevée.



B. Rolland - CRPF RA

Laïche espacée.

■ Les sols

Ce sont des sols alluviaux peu évolués, limoneux, limono-argileux ou sableux. Leur fertilité est généralement élevée.



S. Gaudin - CRPF CA

Sol alluvial.

Gérer l'habitat

Attention : c'est un habitat fragile entièrement dépendant de la proximité et du fonctionnement (inondations) des cours d'eau. Néanmoins, ces caractéristiques stationnelles offrent d'intéressantes potentialités sylvicoles.

■ Modes de gestion recommandés

- Assurer le caractère alluvial de l'habitat en maintenant les essences types,
- privilégier les coupes ponctuelles et non brutales,
- maintenir et favoriser la diversité des essences,
- privilégier la futaie claire permettant le développement du sous-bois,
- favoriser la régénération naturelle sur ces milieux et compléter avec des plants si nécessaire,
- dans les premières années, veiller à l'affranchissement des essences objectives (Chêne, Frêne, Orme) de la strate arbustive (Aulne, Bouleau, Tremble) afin d'éviter la banalisation du milieu,
- si nécessaire, protéger la régénération de la dent du gibier,
- encourager le développement de l'Orme lisse lorsque l'espèce est présente.



P. Blanchard - CRPF PDL

Le robinier peut se révéler envahissant.

■ Les modes de gestion déconseillés

- Les plantations de peuplier,
- les plantations de Robinier surtout sur les sols sableux où il peut se révéler envahissant.



O. Cardot - PNR Marais Poitevin

Cet habitat est typique des forêts inondables.

■ Les interventions à proscrire

- Proscrire toute transformation,
- ne pas utiliser d'engins mécaniques lourds ; préférer les matériels adaptés aux sols humides,
- proscrire tout travail du sol,
- proscrire le drainage du sol,
- dans les zones où il pose problème, éviter les coupes rases de Robinier qui rejette très vigoureusement (préférer le jardinage des cépées existantes) et les coupes rases alentours qui encouragerait son expansion,
- ne pas laisser de rémanents de coupe au sol dans les zones inondables,
- proscrire l'utilisation de produits agro pharmaceutiques.

Lien permettant l'accès aux cahiers d'habitats Natura 2000 : <http://inpn.mnhn.fr/docs/cahab/tome1.pdf>

Code Natura 2000 : 91 FO-3 code Corine 44.4 - Chênaies-ormaies à frêne oxyphylle.

Document réalisé avec le concours financier de :

36 avenue de la Bouvardière
44800 SAINT-HERBLAIN
Tél : +33 (0)2 40 76 84 35 - Fax : +33 (0)2 40 40 34 84
E-mail : paysdeloire@crpf.fr - <https://bretagne-paysdelaloire.cnpf.fr>
Délégation régionale du **Centre National de la Propriété Forestière**



Le CRPF imprime ses documents sur papier certifié PEFC. Suivez son exemple !

Décembre 2011