

Hêtraies-chênaies collinéennes à Houx



Patrick Blanchard © CNPFP

Cet habitat est bien représenté sur la région, notamment dans sa partie nord-ouest ou il occupe des surfaces pouvant être importantes. Il est caractéristique du domaine atlantique au climat humide et aux hivers frais. La flore rassemble des espèces banales mais diverses. La sylviculture est tout à fait compatible voire nécessaire au maintien de cet habitat.

Reconnaître l'habitat

■ Les arbres

Le Hêtre devrait être l'essence dominante sur ce type d'habitat mais la gestion sylvicole de ces peuplements sur notre région l'a relégué au second plan donnant une place prépondérante aux chênes (sessile et pédonculé).



D. Belay - CRPF PDL

Hêtre.



J. Lemaire - IDF

Chêne pédonculé.

■ Les arbustes

Le Houx est omniprésent, mais en quantité variable en fonction de la gestion pratiquée.



Houx.



P. Blanchard - CRPF PDL

Néflier.

CRPF IDF

Présence de néflier.

■ La végétation herbacée

Elle est souvent sporadique, peu recouvrante et pauvre en espèces. Elle se caractérise essentiellement par la présence de la Canche flexueuse, de la Myrtille, du Blechné en épi, du Mélampyre des prés et parfois de la Fougère aigle,...




J.P. Gayot - CRPF Limousin

Myrtille.



S. Ambrosino - CRPF NCP

Canche flexueuse.



P. Gonin - IDF

Blechné en épi.

Gérer l'habitat

Les hêtraies typiques à Houx sont peu nombreuses. Cet habitat se présente plus fréquemment sous l'apparence de peuplements dominés par le chêne sans porter atteinte à son état de conservation. La gestion se doit d'allier protection et production, et pour ce faire, le maintien de l'état observé doit être recherché, voire éventuellement son évolution vers l'état typique.

■ Modes de gestion recommandés

- Le choix de gestion en futaie régulière ou irrégulière importe peu ; il va dépendre de la physionomie du peuplement de départ et des affinités du sylviculteur,
- maintenir et favoriser le mélange d'essences (essences principales et secondaires). Une sylviculture dynamique est alors nécessaire pour éviter l'évolution vers la monoculture de Hêtre. La présence de résineux épars ou en bouquets dans des proportions raisonnables n'est pas incompatible avec les objectifs fixés,
- maintenir, ou favoriser si nécessaire, le sous-bois caractéristique à Houx. Il pourra être réduit et partiellement débroussaillé si besoin lors des opérations de régénération,
- pour faciliter la régénération, un léger travail du sol pourra s'avérer bénéfique. Des compléments de régénération par plantation pourront être effectués si nécessaire avec des plants de chêne et de hêtre,
- la gestion de ces peuplements doit être dynamique. L'intensité et la périodicité des éclaircies doivent permettre le maintien de la diversité des essences et assurer un éclaircissement suffisant du sol favorable au développement de la flore associée,
- conserver un à deux arbres sénescents par hectare pour la faune (chauves-souris, pics, insectes...).

■ Modes de gestion déconseillés

- La transformation avec des essences n'appartenant pas au cortège de l'habitat,
- éviter la monoculture du Hêtre ou du Chêne.



Sous-bois de houx.

■ Les interventions à proscrire

- La transformation avec des essences résineuses,
- la destruction du sous-bois de Houx que ce soit par arasage ou par dévitalisation,
- l'utilisation d'engins mécaniques lourds en période humide notamment sur les sols à dominante limoneuse,
- l'utilisation de produits agro pharmaceutiques.



Eviter la monoculture du hêtre.

Lien permettant l'accès aux cahiers d'habitats Natura 2000 : <http://inpn.mnhn.fr/docs/cahab/tome1.pdf>
Code Natura 2000 : n° 9120-2 code Corine 41.12 - Hêtraies-chênaies collinéennes à Houx.

Document réalisé avec le concours financier de :

36 avenue de la Bouvardière
44800 SAINT-HERBLAIN
Tél : +33 (0)2 40 76 84 35 - Fax : +33 (0)2 40 40 34 84
E-mail : paysdeloire@crpf.fr - <https://bretagne-paysdelaloire.cnpf.fr>

Délégation régionale du **Centre National de la Propriété Forestière**

