

# Les Passereaux patrimoniaux et la gestion sylvicole

Les oiseaux chanteurs appartenant à la famille des Passereaux sont les plus nombreux. Plusieurs espèces utilisent la forêt pour se reproduire, qu'elles soient sédentaires ou migratrices.

Parmi elles, certaines sont en régression dans la région et méritent une attention particulière. Les causes de ce déclin ne sont pas systématiquement liées à la gestion sylvicole mais quelques solutions peuvent permettre de préserver leurs habitats. En effet, plusieurs de ces espèces se situent en limite de leur aire de répartition dans la région et semble subir les effets du changement climatique.

Cette fiche présente les principales espèces patrimoniales ainsi que quelques recommandations en termes de gestion.



Forêt des Pays de la Loire

## LES PASSEREAUX PATRIMONIAUX CONCERNÉS

### Pouillot fitis

Le Pouillot fitis n'est plus vraiment nicheur qu'en Mayenne et en Sarthe. Sa position en limite d'aire de répartition dans la région, dans un contexte de changement climatique, explique en partie ce déclin. Ce migrateur se reproduit principalement au sein de milieux arbustifs jeunes et buissonnants en bordure de zones humides.

### Pouillot de Bonelli

Il s'agit du plus rare des pouillots nichant dans la région. Quasi disparu de Loire-Atlantique et de Vendée, le Pouillot de Bonelli niche encore en petit nombre

ailleurs. Espèce thermophile, il affectionne les boisements clairs, les coteaux ensoleillés, les bordures de coupes, les clairières et les éboulis. Il niche dans une grande variété de peuplements végétaux.

### Pouillot siffleur

Encore bien présent en Mayenne et en Sarthe, ce pouillot se raréfie dans le reste de la région. Également migrateur, le Pouillot siffleur affectionne les vieilles futaies de feuillus avec un sous-étage dégagé. La présence de hêtre lui semble favorable.



Pouillot fitis



Pouillot de Bonelli



Pouillot siffleur



© F. Jiguet

*Grimpereau des bois*



© Michel Bartoli

*Mésange noire*



© Jean-Marie Poncelet\_LPO

*Bouvreuil pivoine*

## Grimpereau des bois

Très ressemblant avec le Grimpereau des jardins, le Grimpereau des bois est très rare dans la région, n'occupant que quelques secteurs de la Sarthe et de la Mayenne. Ce sédentaire affectionne les futaies vieillissantes de chêne et de hêtre, peu denses avec un sous-bois arbustif assez important (houx, charme, etc.).

## Mésange noire

Cette mésange est très rare voire occasionnelle en période de reproduction. On la retrouve dans les boisements de la Sarthe et de la Mayenne où elle montre une préférence pour les peuplements âgés de Pins sylvestres, d'épicéas et de sapins dans les secteurs au relief accidenté.

## Bouvreuil pivoine

Malgré une présence dans tous les départements, le Bouvreuil est devenu un nicheur rare surtout dans l'ouest de la région. Il niche au sein de boisements humides, dans les fonds de vallon, composés de bouleaux, saules et aulnes.

## Rougequeue à front blanc

Après un fort déclin, les effectifs nicheurs de Rougequeue à front blanc semblent en progression. Il demeure rare à l'ouest et plus abondant en Sarthe et en Mayenne. Il niche au sein de boisements âgés le plus souvent feuillus mais également dans les parcelles de résineux avec un sous-étage de feuillus. Il privilégie les parcelles claires et les lisières.

## GERER LES HABITATS

Ces différentes espèces nichent dans des habitats relativement variés. En cas de présence d'une de ces espèces, il convient de conserver son habitat de nidification et d'éviter les travaux forestiers en période de reproduction (du 1er mars au 31 juillet).

Il est conseillé de se rapprocher des associations locales du réseau LPO afin de préciser les enjeux présents dans votre massif et de les concilier dans la gestion sylvicole.



© G. Vitrice\_LPO

*Rougequeue à front blanc*

